

## PLAQUENIL® (Hydrochloroquine)

Plaquenil® is een antireumaticum. Het onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor zwelling en pijn van gewrichten en dringt ochtendstijfheid terug. Plaquenil® wordt ook gebruikt bij het voorkomen en bestrijden van malaria. Naast reumatoïde artritis wordt het ook toegepast bij andere reumatische aandoeningen zoals lupus erythematoses (LE).

### Werking

Plaquenil® werkt langzaam. Het gunstige effect van Plaquenil® op de ziekteactiviteit is pas merkbaar na drie tot zes maanden. Uw arts zal u meestal adviseren om naast Plaquenil® in afwachting van het effect andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken. Indien gewenst kan Plaquenil® jarenlang gebruikt worden.

### Wijze van inname

Plaquenil® bestaat in tabletvorm (200 mg). De dosering kan variëren van 1 tot 3 tabletten per dag. U neemt de tabletten na de maaltijd of voor de nacht in met water en slikt ze in hun geheel door.

## Mogelijke nadelen

Plaquenil® heeft relatief weinig bijwerkingen. Het meest voorkomende probleem is dat de huid gevoeliger kan worden voor zonlicht. Het gebruik van een beschermende zonnebrandcrème is meestal voldoende. Lichte overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag zijn zeldzaam.

U kunt ook last krijgen van de volgende bijverschijnselen:

- ✗ Misselijkheid, braken, diarree
- ✗ Huiduitslag en jeuk
- ✗ Sufheid, vermoeidheid, hoofdpijn
- ✗ Oogproblemen: wazig zien, lichtflitsen

Plaquenil® wordt opgeslagen in allerlei organen, waaronder de ogen. Daarom bestaat bij langdurig gebruik en bij hoge dosering het gevaar voor beschadiging van het netvlies. Deze bijwerking komt echter zelden voor. Uit voorzorg vindt zowel vóór de behandeling als jaarlijks een controle door de oogarts plaats.

## Aandachtspunten

- ✗ Het dagelijks gebruik van Plaquenil in hoge doseringen moet vermeden worden tijdens de zwangerschap behalve wanneer uw arts dit noodzakelijk acht (het risico van stoppen met de behandeling is soms groter dan het mogelijke risico voor de foetus).

Vermoedt u nevenwerkingen? Vermijd het eigenhandig stopzetten van de therapie en bespreek dit eerst met uw arts.