




UW THERAPIE: CAPECITABINE (XELODA®)

Van / tot /

Dosis

Xeloda®

..... mg (’s morgens)		... x tabletten 500 mg 
		... x tabletten 150 mg 
..... mg (’s avonds)		... x tabletten 500 mg 
		... x tabletten 150 mg 

Richtlijnen

- X Xeloda® altijd bij de maaltijd innemen, dit betekent tijdens of binnen dertig minuten na de maaltijd of een tussendoortje.
- X Altijd twaalf uur laten tussen beide innames, bijvoorbeeld ’s ochtends om 8 uur en ’s avonds om 20 uur.
- X Niet kauwen op de tabletten.
- X Tabletten niet pletten of breken.
- X Geen pompelmoessap drinken tijdens de behandeling.
- X Bij vergeten dosis: de volgende dosis op het geplande tijdstip innemen. De vergeten dosis niet inhalen. Niet méér nemen dan voorgeschreven. Meld een vergeten dosis bij uw volgende opname aan uw arts.
- X Bij braken vlak na de inname van Xeloda® hoeft u uw dosis niet te herhalen. Neem de volgende dosis op het geplande tijdstip in. Meld dat u heeft moeten braken.
- X Wanneer u een dosis te veel hebt ingenomen, contacteer dan uw behandelende arts of de arts met wachtdienst via het ziekenhuis.
- X Bij accidentele inname door anderen → contacteer het antigifcentrum (070 245 245).
- X Voor informatie en advies over de nevenwerkingen van deze behandeling: raadpleeg de ChemoWijzer of bespreek dit met uw arts of verpleegkundige.

Overzicht

Op het volgende overzicht kunt u aanvinken of u uw medicatie heeft genomen. Dit kan u helpen om de medicatie juist in te nemen.

Week 1

Datum	.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...
Dag	1	2	3	4	5	6	7
Ochtend	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur
Avond	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur

Week 2

Datum	.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...
Dag	8	9	10	11	12	13	14
Ochtend	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur
Avond	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur	... uur

Week 3

Geen Xeloda[®] tot uw volgende afspraak.

© augustus 2016 UZ Leuven. Overname van deze tekst is enkel mogelijk na toestemming van de dienst communicatie UZ Leuven. Ontwerp en realisatie: deze tekst werd opgesteld door het Leuvens kankerinstituut (LKI) in samenwerking met de dienst communicatie. www.chemotherapie.be
Verantwoordelijke uitgever UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, tel. 016 33 22 11, www.uzleuven.be

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700218.

Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via communicatie@uzleuven.be.