

Xarelto[®] 15/20 mg (rivaroxaban)

MEDICATIE BIJ VOORKAMERFIBRILLATIE (VKF)



- ✓ Xarelto[®] verdunt het bloed en verkleint het risico op het ontstaan van bloedklonters als gevolg van een hartritme-stoornis (voorkamerfibrillatie = VKF).
- ✓ Xarelto[®] moet meestal levenslang ingenomen worden. Vraag de duur van uw behandeling altijd na bij uw arts.
Stop nooit op eigen initiatief.
- ✓ Xarelto[®] wordt 1 keer per dag ingenomen, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip.
- ✓ **Sla geen dosis over.**
Geen medicatie innemen = geen bescherming.
- ✓ Dit geneesmiddel moet met voedsel ingenomen worden. Tabletten mogen geplet worden als slikken moeilijk is.

- ✓ Als u een dosis vergeet, moet u deze binnen de 12 uur na de geplande inname innemen. **Neem nooit een dubbele dosis.**
- ✓ Een bloeding is de meest voorkomende bijwerking van een bloedverdunner. Het vermijden van een bloedklonter is echter meestal veel belangrijker dan het bloedingsrisico. Raadpleeg uw arts als u tekenen vertoont van bloedingen, zoals:

- ongewone blauwe plekken, neusbloedingen, bloeding van het tandvlees, snijwonden die langdurig bloeden
- bloederige fluimen of bloed braken
- rode of zwarte stoelgang, bloed in de stoelgang
- bloed in de urine
- duizeligheid, bleekheid of zwakte

- ✓ Start nooit met een ander geneesmiddel zonder uw arts te raadplegen, zelfs geen pijnstiller zonder voorschrift.
- ✓ Vermeld bij een bezoek aan de (huis)arts, apotheker, tandarts of in het ziekenhuis altijd dat u een bloedverdunner neemt.