

Je therapie: nivolumab (Opdivo[®]) en ipilimumab (Yervoy[®])

DEZE BIJLAGE HOORT BIJ DE GIDS IMMUNOTHERAPIE.

WAT IS DE SAMENSTELLING VAN DEZE THERAPIE?

De therapie bestaat uit twee geneesmiddelen (immunotherapie): nivolumab en ipilimumab.

HOE VERLOOPT DE THERAPIE?

Het onderstaande schema geeft een overzicht van het verloop van één cyclus van de therapie. Eén cyclus duurt drie weken (21 dagen) en omvat één opname voor immunotherapie. Dag 1 is altijd de eerste dag van een nieuwe cyclus. De volgende cyclus start in principe 3 weken na dag 1, als de bloedsuitslagen en je algemene toestand dat toelaten.

Generieke naam	Merknaam	Dag		Wijze van toediening
		1	2-21	
Nivolumab	Opdivo [®]	*		Afhankelijk van de dosis of de indicatie: toediening over 30 of 60 minuten
Ipilimumab	Yervoy [®]	*		Afhankelijk van de dosis of de indicatie: toediening over 30 of 90 minuten

WAAR WORDT DE THERAPIE TOEGEDIEND?

De behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is dan niet nodig.

AANDACHTSPUNT BIJ NIVOLUMAB EN IPILIMUMAB

- Een infuusreactie doet zich zelden voor. Als ze toch voorkomt, is dat meestal tijdens de eerste toediening terwijl je nog in het ziekenhuis bent. Een infuusreactie kenmerkt zich door huiduitslag al dan niet in combinatie met jeuk (eventueel over heel het lichaam), een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of met overmatig transpireren. Het is belangrijk dat je dergelijke gewaarwordingen onmiddellijk meldt aan de verpleegkundige of arts, zodat er vlug en adequaat kan worden gereageerd.