

HYPOGLYCEMIE

Symptomen

- ✓ wisselend humeur
- ✓ hoofdpijn
- ✓ beven
- ✓ zweten



- ✓ duizeligheid
- ✓ bleekheid
- ✓ vermoeidheid
- ✓ slecht zien
- ✓ honger

Hoe opvangen?


I. Als je bij bewustzijn bent:



Bij pomptherapie: géén trage koolhydraten nemen.

*Opmerking


- 1,5 g KH/10 kg lichaamsgewicht (max. 6 g)
 - = ½ tablet druivensuiker
 - = 15 ml cola
 - = 2 ml grenadine
- 5 g KH van een droge koek
 - = 1 petit-beurre
 - = 6 g letterkoekjes
 - = 1 berenkoek



2. Als je bewusteloos bent en/of hulp nodig hebt van anderen:

1 Hypo-Fit® Junior

Smeer gel op de binnenkant van de wangen.
Als het kind bij bewustzijn komt, kun je indien nodig nog druivensuiker of echte cola geven.
Volg de bloedsuikerwaarden op en geef indien nodig nog snelle of trage koolhydraten.



2 GlucaGen® Hypokit

Als Hypo-Fit® Junior niet helpt:



- 1 mg GlucaGen® intramusculair (in de spier van de dij)
of
- 0,5 mg GlucaGen® indien gewicht < 25 kg

Bepaal 10 à 15 minuten na deze toediening de bloedsuiker. Afhankelijk van het resultaat laat je het kind snelle en/of trage koolhydraten eten. Volg de volgende uren de bloedsuikerwaarden op.