

# Spoelingen van de blaas? Niet systematisch!

Fysiologisch

Iso-betadine

Suby-G

# Spoelen met fysiologisch



- **Indicaties:**
  - **Acute of chronische verstopping** tgv van troebele urine, mucusvorming of debris (incrustatie)
  - **Preventief na** herhaaldelijk verstopping
  - Preventie van het verstopping van een urinaire katheter **bij bloedklonters**
- **Contra- indicaties:** recente blaasbloeding
- **Frequentie:** Meestal 2 maal per week, maar kan afhankelijk van het probleem verhoogd worden tot maximaal 1 maal per dag.



# Spoelen met Iso Betadine (1/10)

Indicaties:

- **Asymptomatische bacteriurie** waarbij de urinecultuur geen Pseudomonas-of Proteuskiemen aangeeft.

Contra- indicaties: recente blaasbloeding

Werkwijze

- 10 min laten inwerken
- 3 maal per week, gedurende 3 weken en zo nodig tot maximaal 3x herhalen
  - D3 na de laatste spoeling van een volledige behandeling een urinestaal ter controle afnemen.
  - Indien positief blijft op de vastgestelde kiem, moet de behandeling herstart worden. Blijft de urinecultuur positief, raadpleeg dan de uroloog.





## Spoelen met suby G

- Indicaties:  
**Bij steen- of gruisafzetting** tgv een UWI met bacterie, Proteus Mirabilis of indien **geen verbetering na blaasspoelingen met fysiologisch en/of Isobetadine Dermicum.**
- Contra- indicaties: recente blaasbloeding
- 10 min in laten werken
- Frequentie:
  - Proteusinfectie: 2maal per week, gedurende 3 weken en zo nodig tot maximaal 3x herhalen
  - Ter preventie van verstopping van de sonde: 2 tot 3x/week